



Argomento all'ordine del giorno	Esito della seduta della CTRF
<p>1. Utilizzo di medicinali allergeni, di cui agli Allegati AIFA 2 e 3</p>	<p>1. La CTRF conclude la valutazione.</p>
<p>2. Approvazione schede istruttorie ed individuazione Centri prescrittori:</p> <p>2.1. SCHEDE ISTRUTTORIA CARCINOMA PROSTATA</p> <ul style="list-style-type: none">- Abiraterone indicato insieme a prednisone o prednisolone per il trattamento del carcinoma della prostata ormono-sensibile metastatico (metastatic hormone sensitive prostate cancer, mHSPC) ad alto rischio e di nuova diagnosi in associazione a terapia di deprivazione androgenica (androgen deprivation therapy, ADT) in uomini adulti;- NUBEQA - darolutamide indicato per il trattamento degli uomini adulti con carcinoma prostatico metastatico sensibile agli ormoni (mHSPC) in associazione a docetaxel e a terapia di deprivazione androgenica;- ORGOVYX - relugolix indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma prostatico in stadio avanzato sensibile agli ormoni <p>2.2. SCHEDE ISTRUTTORIA LINFOMA DIFFUSO A GRANDI CELLULE B</p> <ul style="list-style-type: none">- BREYANZI - lisocabtagene maraleucel indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL), linfoma primitivo del mediastino a grandi cellule B (PMBCL) e linfoma follicolare di grado 3B (FL3B) recidivati o refrattari, dopo due o più linee di terapia sistemica;- ZYNLONTA - loncastuximab tesirine indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL) e linfoma ad alto grado a cellule B (high-grade) recidivanti o refrattari, dopo due o più linee di terapia sistemica;- COLUMVI - glofitamab indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) recidivante o refrattario dopo due o più linee di terapia sistemica <p>2.3. EYLEA - aflibercept indicato nei neonati pretermine per il trattamento di retinopatia del prematuro (Retinopathy Of Prematurity, ROP) con zona I (stadio 1+, 2+, 3 o 3+), zona II (stadio 2+ o 3+) o AP-ROP (ROP aggressiva posteriore)</p> <p>2.4. FILSUEVZ - estratto di corteccia di betulla indicato per il trattamento di lesioni a spessore parziale associate</p>	<p>2.1. La CTRF conclude la valutazione. 2.2. La CTRF conclude la valutazione. 2.3. La CTRF conclude la valutazione. 2.4. La CTRF conclude la valutazione. 2.5. La CTRF conclude la valutazione.</p>



<p>a epidermolisi bollosa distrofica nella forma recessiva (RDEB) nei pazienti di età pari o superiore a 6 mesi</p> <p>2.5. ORKAMBI - lumacaftor/ivacaftor indicato per il trattamento della fibrosi cistica (FC), in pazienti di età pari o superiore ad 1 anno omozigoti per la mutazione F508del nel gene regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (CFTR)</p>	
<p>3. Valutazione della scheda istruttoria di PLUVICTO – Lutezio (177Lu) indicato, in associazione a terapia di deprivazione androgenica (androgen deprivation therapy, ADT) con o senza inibitore della via del recettore degli androgeni (androgen receptor, AR), per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione (metastatic castration-resistant prostate cancer, mCRPC) progressivo, positivo all'antigene di membrana specifico della prostata (prostate-specific membrane antigen, PSMA), che sono stati trattati con inibitore della via dell'AR e chemioterapia a base di taxani</p>	<p>3. La CTRF conclude la valutazione.</p>
<p>4. Presentazione del documento “Linee di indirizzo regionali per la gestione dei farmaci C(nn)”</p>	<p>4. La CTRF conclude la valutazione.</p>
<p>5. Richieste di riconoscimento quali Centri autorizzati alla prescrizione di farmaci da parte di strutture territoriali: valutazione della procedura di valutazione e parere alle richieste pervenute</p>	<p>5. La CTRF conclude la valutazione.</p>