



Argomento all'ordine del giorno	Esito della seduta della CTRF
<p>1. Nuovi confezionamenti in classe C(nn) del radiofarmaco GALLIAPHARM - Germanio Cloruro (68Ge) /Gallio Cloruro (68Ga)</p>	<p>1. La CTRF prende atto.</p>
<p>2. Approvazione schede istruttorie ed individuazione Centri prescrittori: <u>ONCOLOGIA</u></p> <p>2.1. OPDIVO – nivolumab indicato in monoterapia per il trattamento adiuvante di adulti con melanoma allo stadio IIB o IIC o con melanoma con coinvolgimento dei linfonodi o malattia metastatica che sono stati sottoposti a resezione completa</p> <p>2.2. JEMPERLI – dostarlimab indicato in associazione a carboplatino e paclitaxel per il trattamento di pazienti adulte affette da cancro endometriale (CE) primario avanzato o ricorrente con deficit del sistema di mismatch repair (dMMR)/elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H) e che sono candidate per la terapia sistemica</p> <p>2.3. ELAHERE – mirvetuximab soravtansine indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulte con cancro epiteliale dell'ovaio, cancro della tuba di Falloppio o cancro peritoneale primitivo, positivo al recettore alfa dei folati (FRα), platino-resistente, sieroso di alto grado, che hanno ricevuto da uno a tre precedenti regimi di trattamento sistemico – farmaco C(nn)</p> <p><u>MALATTIE RARE</u></p> <p>2.4. ZOKINVY – lonafarnib indicato per il trattamento di pazienti di età pari o superiore a 12 mesi con diagnosi geneticamente confermata di sindrome progeroide di Hutchinson-Gilford (SPHG) o laminopatia progeroide (LP) carente di elaborazione associata a una mutazione eterozigote di LMNA con accumulo di proteine progerin-simile o a una mutazione omozigote o eterozigote composta di ZMPSTE24</p> <p>2.5. AGAMREE – vamorolone indicato per il trattamento della distrofia muscolare di Duchenne (DMD) in pazienti di età pari o superiore a 4 anni – farmaco C(nn)</p> <p><u>ALTRO</u></p> <p>2.6. ELADYNOS – abaloparatide indicato nel trattamento di prima scelta nella prevenzione secondaria in donne con pregresse fratture vertebrali o di femore e T-score colonna o femore <-2,5 e > -5.0 (T-score <-2,0 e > -5.0 se di età superiore a 65 anni) + ≥ 2 fratture vertebrali</p>	<p>2.1. La CTRF rimanda la valutazione.</p> <p>2.2. La CTRF rimanda la valutazione.</p> <p>2.3. La CTRF rimanda la valutazione.</p> <p>2.4. La CTRF rimanda la valutazione.</p> <p>2.5. La CTRF rimanda la valutazione.</p> <p>2.6. La CTRF sospende la valutazione.</p>



lievi o almeno 1 moderata o storia di frattura ad avambraccio, omero, sacro, pelvi, anca, femore, o tibia negli ultimi cinque anni	
3. Approvazione della scheda istruttoria e della scheda prescrittiva regionale del farmaco XERAVA – eravaciclina indicata nel trattamento di infezioni intra-addominali complicate (cIAI) negli adulti da germi multiresistenti ai trattamenti di prima linea – sospesa	3. La CTRF conclude la valutazione.
4. Farmaci per il trattamento del Diabete Mellito di tipo 2 – Nota AIFA 100: analisi dei dati di spesa e consumo e predisposizione di documento d'indirizzo.	4. La CTRF conclude la valutazione.
5. PNCAR: individuazione di un Gruppo di Lavoro (GdL) regionale per la definizione di procedure per il corretto smaltimento di farmaci antibiotici	5. La CTRF conclude la valutazione